



de
EXPERTO



**Para un control eficiente de las clostridiosis
más importantes de los rumiantes**

MILOXAN[®]



Nuestra experiencia, tu tranquilidad

Miloxan[®] suspensión inyectable para bovino, ovino y caprino. **Composición:** Cada dosis (2 ml) contiene: Toxoide β de *Clostridium perfringens* tipo B ≥10 UI; Toxoide ε de *Cl. perfringens*, tipo D ≥5 UI; Toxoide de *Cl. septicum*, ≥2,5 UI; Toxoide de *Cl. novyi* tipo B ≥3,5 UI; Toxoide de *Cl. tetani* ≥2,5 UI; Toxoide de *Cl. sordellii* 90% protección; *Cl. chauvoei* inactivado (anacultivo) 90% protección. Adyuvante: Hidróxido de aluminio. **Especies de destino:** Bovino, ovino y caprino. **Indicaciones:** Inmunización activa y pasiva contra enfermedades asociadas a infecciones causadas por *Clostridium sordellii*, *Clostridium perfringens* tipo B, *Clostridium perfringens* tipo C, *Clostridium perfringens* tipo D, *Clostridium chauvoei*, *Clostridium septicum*, *Clostridium novyi* y contra el tétanos causado por *Clostridium tetani*. **Uso durante la gestación y la lactancia:** Bovino y ovino: Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia. Caprino: No utilizar durante los últimos meses de gestación. **Reacciones adversas:** En muy raras ocasiones puede provocar la formación de un nódulo transitorio en el punto de inyección y reacciones de hipersensibilidad en los animales sensibilizados por la infección. **Posología:** Vía subcutánea. Bovinos de más de 4 meses: 4 ml. Bovinos de menos de 4 meses, ovinos y caprinos: 2 ml. **Tiempo de espera:** Cero días. **Conservación:** Conservar y transportar refrigerado (entre 2°C y 8°C). Proteger de la luz. No congelar. **Nº autorización:** 3145 ESP. **Presentación:** Vial de 50 y 250 ml. **Titular:** Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario. En caso de duda consulte a su veterinario.**