

PREPARADAS, LISTAS...

¡YA!

¿Periodos improductivos?
NO, GRACIAS

Chronogest[®]
liberación controlada 20mg

**BUENAS PRÁCTICAS
DE APLICACIÓN**



MSD

Animal Health

1. SELECCIÓN DE LOS LOTES



Seleccionaremos los lotes de animales a cubrir y sincronizar celos atendiendo a:

- Carne: que lleven al menos 2 meses paridas o estén vacías tras realizar ecografía.
- Leche: en ganaderías de alta producción, para obtener mejores resultados, podemos utilizar este método después del pico de lactación, alrededor del 3er mes postparto.

2. PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES



El día de la colocación de las esponjas dispondremos de todo el material necesario: guantes de un solo uso, aplicadores, las esponjas y un cubo con doble seno para disponer de agua con jabón en un lado y, en el otro, agua con desinfectante para la higienización (desinfección) de los aplicadores tras cada aplicación.

3. EXPLORACIÓN PREVIA




Se recomienda realizar exploración vaginal de las hembras antes de aplicar la esponja, lo que nos permitirá detectar posibles anomalías (atresia vaginal, himen fibroso, huesos de fetos abortados,...).

En el caso de las corderas procederemos a desvirgarlas, si es necesario, al menos 7 días antes de la puesta de esponjas. No se recomienda hacerlo el día de la colocación de la esponja para evitar adherencias.

4. APLICACIÓN DE CHRONOGEST®

Colocaremos la esponja en el aplicador, lo introduciremos en la vagina con suavidad y nos ayudaremos del gatillo del aplicador que empuja el émbolo para dejar la esponja colocada en el fondo de la vagina. Tras ello retiraremos el aplicador, quedando el hilo de la esponja colgando por fuera de la vagina. Si se considera necesario se puede cortar el hilo, según la longitud del rabo de los animales, para que quede oculto tras el mismo y así evitar que lo muerdan.




5. RETIRADA DE CHRONOGEST®

Una vez cumplidos los días de tratamiento, procederemos a la retirada de la esponja tirando suavemente del hilo hacia fuera y hacia abajo para facilitar su extracción.

En caso de optar por el uso de un espéculo vaginal para extraer la esponja, lo introduciremos cerrado en la vagina y, una vez dentro, lo abriremos y visualizaremos la esponja (podemos ayudarnos de una linterna para ver el fondo de la vagina). Con la ayuda de una pinza extraeremos la esponja.

Después de la retirada procederemos a inyectar por vía intramuscular la dosis correspondiente en cada caso de Foligon® (PMSG).



¿Periodos improductivos?
NO, GRACIAS

Chronogest[®]
liberación controlada 20mg



Síguenos en

facebook

 **Instagram**



MSD

Animal Health