


Mamiyet o y c 57

El golpe perfecto
que complementa
tu estrategia frente
a ***Staphylococcus
aureus***



CONSECUENCIAS DE LA MASTITIS CAUSADA POR *S. AUREUS*

- ↑ RCS (*recuento de células somáticas)
- ↓ Producción
- ↑ Contagiosidad en el ordeño
- ↑ Cronificación de mastitis
- ↑ Costes




- ↓ Calidad
- ↑ Penalización
- ↑ Riesgo de residuos de antibióticos en la leche
- ↑ Desviejes prematuros
- ↑ Mortalidad
- ↓ GMD (*Ganancia media diaria) en los corderos

Mastitis en pequeños rumiantes. C. Gonzalo, y col. Ganadería ISSN 1695-1123, N°. 108, 2017, págs. 30-34.
Riaguas y col. 2012. Las mamitis clínicas y subclínicas en ganaderías de ovino de carne en Aragón. Tierras de Castilla y León: Ganadería, ISSN 1889-0784, N°. 170, 2010

PLAN DE VACUNACIÓN

Ovino de leche, ovino de carne y caprino



(*) Para conseguir la óptima respuesta inmunitaria durante el periodo de lactación, se recomienda hacer coincidir las revacunaciones entre 3-4 semanas antes del parto



Mamiyet O y C 57

Suspensión inyectable

- *Staphylococcus aureus* cepa NCTC 1803, inactivada.
- Suspensión inyectable.
- Para la inmunización activa del ganado ovino y caprino frente a la mamitis gangrenosa producida por *Staphylococcus aureus*.
- Autorizada en gestantes y lactantes.



Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
En caso de duda consulte a su veterinario.



laboratorios **syva** s.a.

Sede Central: Parque Tecnológico de León
Calle Nicostrato Vela M 20 • 24009 León - España
Tel.: 987 800 800 • e-mail: mail@syva.es • www.syva.es

